

ARTRODESE DE COLUNA VERTEBRAL EM NÍVEL LOMBAR COM TÉCNICA DE PARAFUSO PEDICULADO EM TRÊS OU MAIS NÍVEIS COM DUPLA ABORDAGEM

Defesa:

02 de dezembro de 2002

Membros da Banca:

Prof. Dr. Carlos José Serapião (Orientador)

Prof. Dr. Edson Sydney de Campos (Membro interno)

Prof. Dr. Elcio Landim (Membro externo)

Resumo:

Estudo retrospectivo realizado no Twin Citi Spine Center (T.C.S.C), Minnesota E.U.A., em pacientes portadores de Doença Discal Degenerativa Lombar (D.D.D.L.) que foram submetidos à técnica cirúrgica com artrodese via anterior e posterior, acrescido do uso de parafusos pediculares em três ou mais níveis, no período de janeiro de 1987 a janeiro de 1996. Oitenta e dois pacientes participaram efetivamente deste estudo que constituiu de responder um questionário previamente organizado, deste total de pacientes da amostra 55 (67%) destes, apresentaram cirurgia na coluna lombar previamente. A idade variou de 35 a 74 anos, com média de 51 anos. O acompanhamento mínimo foi de dois anos, com a média de quatro anos e dois meses. A fusão vertebral foi obtida em 70 (85%) pacientes e, destes, 61 (74%) relataram estar "melhor" ou "muito melhor" que antes da cirurgia. Concluí-se que a adequada seleção dos pacientes e o uso da técnica correta, permitem alcançar bons resultados em uma alta percentagem de pacientes.

Palavras-Chave: Artrodese; Degeneração Discal; Parafuso pediculado.