

## **ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DO CÂNCER DA PELE EM FOZ DO IGUAÇU- PR**

### **Defesa:**

Joinville, 29 de fevereiro de 2012

### **Membros da Banca Examinadora:**

Prof. Dr. Mauro de Souza Leite Pinho - Orientador

Profa. Dra. Vanessa Santos Cunha (UFSC)

Prof. Dr. Edson Sydney de Campos (UNIVILLE)

### **Resumo:**

O câncer tem sido a terceira principal causa de morte de adultos no Brasil (12,32% de todos os casos), sendo superado apenas pelas doenças cardiovasculares ou outras causas externas. A cidade de Foz do Iguaçu apresenta características migracionais forte influência de grupos étnicos caucasianos, sendo, portanto, supostamente vulnerável a uma incidência maior no tocante ao câncer da pele. O objetivo deste estudo foi verificar a incidência de câncer de pele em Foz do Iguaçu durante os últimos cinco anos por meio da revisão dos laudos emitidos por todos os laboratórios de anatomia patológica da cidade. Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo observacional com delineamento transversal, baseado na análise de laudos anatomopatológicos, referentes à totalidade dos casos. Os casos foram analisados segundo as variáveis envolvidas, tais como a distribuição anual de 2005 a 2009, gênero, idade, localização, tipo histológico do tumor e do tipo de assistência oferecida ao paciente (público ou privado). Quanto à análise estatística de dados, os programas Epidata® 3.1 e Epiinfo® 6,04 foram utilizados. Foram identificados 2.186 laudos de câncer de pele, sendo mais freqüente no sexo feminino, predominando na faixa etária dos 50-59 anos e entre 70-79 no caso dos homens. Além disso, observou-se uma incidência anual crescente dentro do período de estudo, sendo predominante no sexo feminino, o que representou 61% do montante total dos casos diagnosticados. Observou-se que a face foi a parte que apresentou maior incidência de câncer de pele em relação ao número total de casos, em ambos os sexos (59,1%), sendo no sexo feminino 66% e no masculino 48%. Quanto ao tipo histológico, o carcinoma basocelular representou 79,9% do valor total, sendo seguido pelo carcinoma espinocelular (12,3%) e o melanoma (7,8%). Este estudo possibilitou descrever o perfil dos indivíduos com câncer cutâneo atendidos no serviço público ou privado, dermatológicas, bem como no serviço de referência em oncologia localizado na cidade.

**Palavras-Chave:**

Câncer de pele, Foz do Iguaçu, Anatomia patológica