

Recomendações de biossegurança

- **Evitar aglomerações e ambientes fechados;**

- **Evitar contato físico** com pacientes e colegas;

- **Usar EPIs** (gorro, óculos de proteção, máscara N95/PFF2 ou equivalente, protetor facial, avental impermeável e luvas de procedimento);

- **Lavar cuidadosamente as mãos** antes e após o atendimento do paciente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;

- **Utilizar colutório antimicrobiano**, pré-procedimento, por meio de bochecho com 15 ml de solução por 30 segundos;

- Após cada consulta, **reforçar a limpeza de todas as superfícies e ambiente de trabalho**: bancadas, armários, torneiras, cadeiras, focos, mochos, etc;

- Seguir **rigorosamente os princípios de esterilização e desinfecção de materiais e instrumentais;**

- **Esterilizar em autoclave todos os instrumentais** considerados críticos, inclusive canetas de alta e baixa rotação;

- Ao final da desparamentação, **higienizar óculos de proteção ou protetor facial e lavar as mãos;**

- **Colocar barreiras mecânicas**: alças de refletores, botões manuais de acionamento, encosto da cabeça, braços da cadeira odontológica, encosto do mocho, seringa tríplice, pontas de unidade de sucção.